

Către: **Societatea de Neuropatie Diabetica**

În atenția: **Dlui Presedinte Conf. Dr. Ioan A. Veresiu**

Ref : **Patient Database Survey Diabet 2013**

București, 17 aprilie 2014

Stimate domnule Presedinte ,

Referitor la solicitarea dumneavoastră cu privire la incidența neuropatiei diabetice în rândul pacienților cu diabet zaharat vă prezentăm mai jos câteva precizări și concluzii care reies din proiectul de tip ***Patient Database Survey (PDS)*** având ca subiect tratamentul în diabet, derulat de compania Cegedim Romania la nivel național în 2013.

Participanți:


- Medici: **90 de diabetologi**, eșantion reprezentativ la nivel național, eroare maxima $\pm 8\%$;
- Pacienți: medicii au completat câte 17 fișe de pacienți cu diabet aflați în evidență (5 pacienți nou diagnosticați la vizita curentă, 5 pacienți cronici aflați deja în tratament doar cu antidiabetice orale, 5 pacienți cronici aflați în tratament cu antidiabetice orale și insulină și 2 pacienți cronici în tratament doar cu insulină), rezultând un eșantion de **1.526 de pacienți** cu diabet tip 1 și 2 (eroare maxima $\pm 2,5\%$).

Obiective :

- Estimarea numărului de pacienți cu diabet tip 1 și 2;
- Identificarea schemelor terapeutice folosite în tratamentul diabetului zaharat de tip 1 și 2;
- Dimensionarea segmentelor de inițiere, continuare și schimbare de tratament;
- Definirea profilului pacientului diabetic pe baza unor indicatori relevanți pentru această patologie (sex, vârsta, IMC, nivelul HbA1C, glucoza serică *a jeun* și postprandială, factori de risc asociați, etc).

Rezultate :

Pe baza rezultatelor obținute se observă că în anul 2013, **incidența neuropatiei ca patologie asociată diabetului de tip 1 și de tip 2 este de 44%** la nivel de total eșantion pacienți înrolați în studiu. Procentul se menține aproape constant, dacă luăm în considerare rezultatul de 43% obținut în anul anterior al studiului, derulat în 2012. În rândul pacienților cu diabet zaharat tip 1 incidența neuropatiei este de **56%**, comparativ cu **44%** în anul din 2012, iar în rândul pacienților cu diabet zaharat tip 2 atât în 2013 cât și în 2012 incidența neuropatiei este de **43%**.



Dorim să vă mulțumim încă o dată pentru cooperarea de până acum și să ne afirmăm deschiderea pentru noi colaborări.

Rămânem la dispoziția dvs. pentru alte detalii sau întrebări suplimentare.

Cu considerație,

Petru Crăciun
 Director General

